

WPA Benelux



Nieuws 2015/1

WPA – Nieuwsbrief 1 – 2015

Blz. 2	Van het bestuur
Blz. 3	Jaarvergadering 2015
Blz. 5	Fazanten in Vietnam
Blz. 12	Nieuwsflitsen
Blz. 14	Lidmaatschap en agenda



Griel in natuurlijk biotoop

(Burhinus oedicnemus)

Foto Marleen Blockx

Colofon

Voorzitter

Ludo Pinceel

Secretaris

Paulo Raeymaekers

Penningmeester

Teun van de Braak

Leden

Dr. Serafino Di Cristofaro

Frédéric Verstappen

Ivan Roels

Dirk Callebaut

Jaak Janssen

Coördinator studbooks

Ivan Roels

Website

www.wpa-benelux.info

E-mail

info@wpa-benelux.info

Hoofdredacteur Nieuwsbrief

Ludo Pinceel

Leden European Conservation Breeding Group

Ludo Pinceel

Paulo Raeymaekers

Frédéric Verstappen

Internationale contacten

Steven Vansteenkiste

Veterinaire aspecten

Loi Burger

Ereleden

Han Assink postuum

Dieter Arnolds postuum

Madelon Willemsen

Postadres secretariaat

Paulo Raeymaekers

Lage weg 37c

2470 Retie

België

Raad van Advies

R. van Bockstaele

Prof. Dr. G.M. Dorrestein

Ir. R. Holsheimer

Drs. Ir. P.P. van der Lugt

Drs. Ing. Ronald Wezeman

Van het bestuur

Nog even en het zesde deel van het jaar 2015 is alweer achter de rug. Onze vogels vliegen, maar de tijd doet dapper mee. Na twee eerder rustige maanden wordt het vanaf maart alweer druk op het WPA-front. Meer info hierover vind je in onze agenda. Zoals altijd proberen we op zoveel mogelijk activiteiten vertegenwoordigd te zijn. Iedereen die geïnteresseerd is kan meer inlichtingen bekomen bij de secretaris of bij de voorzitter.

De belangrijkste datum op korte termijn is onze Algemene Vergadering die dit jaar doorgaat op 21 maart: een ideale gelegenheid om het begin van de lente samen te vieren. Deze keer zijn we 's namiddags te gast bij Noël Hendrikx te Overpelt. Het is denk ik totaal overbodig deze "grote" vogelliefhebber aan jullie voor te stellen en zoals velen onder ons weten is een bezoek aan zijn collectie altijd meer dan de moeite waard. We hopen dan ook weer op een talrijke opkomst. Meer informatie en een dagorde vind je verder in deze nieuwsbrief. Noteer alvast ook zaterdag 26 september met een rode stip in je agenda, want dan gaat in Ouwehands Dierenpark in Rhenen onze jaarlijkse fazantendag door. Uiteraard krijg je in de volgende bladzijden ook nieuwsflitsen met een update van de lopende projecten en focusgroep activiteiten. Daar zie je dat er ook buiten het kweekseizoen door onze leden niet wordt stilgezeten. Omdat Vietnam al jarenlang onze bijzondere interesse heeft, ondermeer door de goede contacten met Hanoi Zoo en het project rond de redding van de Edwardsfazant, brengen we in dit nummer het eerste deel van een artikel over de fazanten van Vietnam. Het werd geschreven door onze vriend Edouard Jelen en het leert ons dat dit land in zuid-oost Azië ons op fazantengebied nog heel wat te bieden heeft.

Rest me aan iedereen een schitterend 2015 toe te wensen met succes in al je ondernemingen!

Uitnodiging jaarvergadering

Op **zaterdag 21 maart** 2015 is onze jaarvergadering gepland.

Zoals afgesproken is deze jaarvergadering gekoppeld aan een hokbezoek bij één van onze leden.

Dit jaar hebben we een hokbezoek voorzien bij een bekend liefhebber, namelijk Noël Hendriks Ballaststraat 23 Overpelt in België.

Noël en Patricia beschikken over een ganse collectie steltlopers, fazanten, duiven en toerako's.

Dit is zeker een bezoek waard.

De jaarvergadering heeft plaats in de "Wedelse Molen", Breugelweg 250, Overpelt. Dit is in de nabijheid van Noël Hendriks. Er is daar een broodjesmaaltijd met soep en koffie voorzien voor de deelnemers aan het hokbezoek en/of de jaarvergadering.

Programma:

14h30: onthaal gevolgd door het bezoek aan de collectie

17-18h: broodjesmaaltijd

18h: aanvang jaarvergadering

20h30: einde jaarvergadering

Voor de liefhebbers die willen deelnemen aan de maaltijd vragen we ter plaatse een tussenkomst in de kosten van 5€. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 14 maart 2015 bij de secretaris .

Paulo Raeymaekers,
Secretaris

Lage weg 37c 2470 Retie
(00)32 14 378676 paulo.raeymaekers@skynet.be



World Pheasant Association – BeNeLux
JAARVERGADERING

Zaterdag 21 maart 2015 te Overpelt
AANVANG 18.00 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Verslag jaarvergadering 2014, zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2014
3. Jaarverslag 2014 van de secretaris
4. Financieel verslag 2014 van de penningmeester stand van zaken betreffende de inning van de contributie
5. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2016
6. Verslag kascommissie 2014
7. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2015
8. Fazantendag WPA-Benelux 2015.
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Aftredend volgens rooster zijn: Teun van de Braak, Dr. Serafino di Cristofaro, Dirk Callebaut en Ivan Roels, ze zijn herkiesbaar.
Er is nog minstens één vacature niet ingevuld. Kandidaturen voor het bestuur kunnen tot één week voor de vergadering bij de secretaris ingediend worden..
10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
aftredend in 2016: Paulo Raeymaekers
aftredend in 2017: Frédéric Verstappen
aftredend in 2019: Ludo Pinceel
aftredend in 2020: Teun van de Braak, Dr. Serafino di Cristofaro, Dirk Callebaut en Ivan Roels
11. Rapportage werkgroepen:

Kamhoenders	Jaak Janssen
Kraagfazanten	Victor Steenackers
Pauwfazanten	Peter Paul van der Lugt/ Franz Duister
Vuurrugfazanten	Dirk Callebaut
Tragopanen	Bart Verbruggen
12. ECBG-activiteiten:
 - a. verslag Frédéric Verstappen
 - b. Edwards-project Ludo Pinceel
13. Stamboeken: verslag Ivan Roels, Frédéric Verstappen en Paulo Raeymaekers
14. Rondvraag en Sluiting

De fazanten van Vietnam (eerste deel)

(tekst door Edouard Jelen - Vertaling Ludo Pinceel)

Dit land in Zuid-Oost Azië heeft een oppervlakte van 331.700 km², dit is ongeveer de helft minder dan Frankrijk. Het strekt zich langwerpig uit tussen de bergketen van het Annamgebergte en de kust. Het indrukwekkende aantal inwoners van om en bij de 92 miljoen heeft als gevolg dat de landbouw voor de productie van voedsel zich uitstrekt tot in de heuvels, volgens de methode van de terrasbouw. Op die manier vormt, naast de beperking en fragmentatie van het natuurlijke habitat, de druk van jagen en stropen een permanente bedreiging voor de wilde fauna. De bergen en de hoogplateaus, die twee derde van het land uitmaken, bieden op die manier een ontoereikend toevluchtsoord voor de verbazingwekkende diversiteit van de Vietnamese fauna.

De fazanten zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in dit land met de Groene pauw, de Gekuipte Argus, de Prelaatfazant, niet minder dan vier ondersoorten van de Zilverfazant, de Ghigi-Chinquis pauwfazant, de Germain-pauwfazant en tenslotte de Edwards-fazant. Nog twee andere "soorten" intrigeren ons tot op de dag van vandaag: de Keizerfazant (een natuurlijke hybride met de Annam-zilverfazant) en de Vietnam-fazant, waarschijnlijk het resultaat van inteelt in geïsoleerde Edwards populaties.

De Groene Pauw (*Pavo muticus imperator*) Delacour 1949

Deze soort bewoont de open ruimten in de wouden langs de rivieren of in de buurt van vochtige gebieden en dit tot op 1500m hoogte aan weerszijden van de grenzen tussen Laos, Cambodja en Vietnam. Volgens Madge & McGowan (2002) bewoont hij de bossen langs het water, de aanliggende open ruimten en de plantages. In het begin van de vorige eeuw waren de groene pauwen alomtegenwoordig in het land. Vandaag zijn ze verdwenen in het noorden en in de meeste



Groene pauw @ WPA-Duitsland

centrale provincies en zijn ze alleen nog te vinden in het Cat Tien National Park. De wereldpopulatie wordt op minder dan 10.000 individuen geschat en volgens de criteria van de IUCN wordt de soort dan ook als "Kwetsbaar" bestempeld.

De naam "*muticus*" (Linnaeus 1766) is afgeleid van het Latijnse woord "*mutilus*", wat "*beschadigd, ingekort, afgeknot*" betekent en niet "*stom*" wat vaak verkeerdelijk wordt aangegeven. Talrijke auteurs namen deze fout over, Delacour inbegrepen. Linnaeus baseerde zich op een oude beschrijving van Aldrovani (Frans botanicus, 1522-1605) die de vogel zelf "Japanse pauw" genoemd had. Linnaeus beging dus een tweede fout door deze informatie omtrent de herkomst



van deze pauwensoort niet te verifiëren. Buffon gaf hem de Franse naam "*spicifère*" (letterlijk: stekeldrager) omwille van de vorm van zijn kuif, die min of meer stekelvormig is, terwijl die van de Blauwe pauw waaivormig is. (Alain Hennache & Michel Ottaviani, Monographie des Faisans, p255-256).

De gekuifde Argusfazant (*Reinardia ocellatus ocellatus*) Elliot 1871

Het geslacht *Reinardia*, Maingounat 1882, telt maar één soort: *ocellata* met twee ondersoorten: *R.o.ocellata*, die voorkomt in Laos en Vietnam en *R.o.nigrescens*, de Maleise vorm. De geschiedenis van de naamgeving van deze soort is interessant. Verraux bestudeerde tussen 1835 en 1859 vijf onbekende staartpluimen in de collectie van het Museum van Parijs. Hij gaf ze de naam "*ocellatus*", als een nieuwe soort Argusfazant. Eerder in 1815 had Rafinesque het geslacht "*Argusianus*" ingevoerd voor de Argusfazant die door Linnaeus "*Phasianus argus*" genoemd was in 1766. De vogel is zeer schuw en bewoont primair vochtig woud van 100m tot 700m hoogte. Hij kan echter tot 1500m en zelfs tot 1900m hoogte opklimmen (Dalat plateau, Eames & al. 1992; Eames 1995). De gekuifde Argus is verwant met de Argusfazant en met de pauwfazanten, ondanks hun grootteverschil, vooral door hun geringe legselgrootte van



Gekuifde Argus @ Beebe 1926

twee eieren en ook door andere biologische



@ Phan Viet Lam

karacteristieken. Deze bijzondere en fabelachtige vogel zou aan de basis liggen van de legende van de fenix, een mytische vogel en een symbool van macht, dit volgend Hachisuka (1925) en Jabouille (1930). Eames (1995) veronderstelt hun aanwezigheid in alle 13

provincies van Vietnam. De fragmentatie van hun habitat en het niet respecteren van het jachtverbod vormen de voornaamste bedreigingen.

De Prelaafazant (*Lophura diardi*) Bonaparte, 1856

Vinden we terug in de talrijke streken van het oude Indochina: van oost tot zuid Laos, in het noord-oosten en het zuid-oosten van Thailand, in Cambodja en in het oosten van Vietnam vanaf het noorden van Annam. De Prelaafazant bewoont over 't algemeen primair en secundair bos evenals de dichte bamboebosjes op lage hoogte, van zeeniveau tot op een hoogte van 800m. In het nationaal park van Bach Ma in Vietnam, leeft hij tussen de 300m en 900m, in de bossen van de vlakke en de heuvels.

De soort lijdt sterk onder de vernietiging van haar habitat voor de landbouw en door de exploitatie van de bossen, maar ook door de sterke druk van vangsten voor locale consumptie en voor de handel. Ze is onderwerp van een kweekproject *in situ* in Bangpra in Thailand in het kader van reïntroductie. In het midden van de jaren 1980 was Bangpra één van de beste kweekcentra voor fazanten in zuid-oost Azië. Vroeger was de soort sterk verbreid in Vietnam, maar recent werd de Prelaafazant nog slechts waargenomen in de reservaten in noord en centraal Annam (Nguyen Cu 1995) en in het uiterste zuiden (Nguyen Van Vy *et al.* 1997), waar hij lokaal gewoon zou zijn.

De koning van Siam schonk een exemplaar aan het museum van Parijs in 1862, het eerste op Europese bodem. Sindsdien heeft de soort zich in het hele westen verspreid. Een aantal is zelfs vanuit Groot-Brittannië teruggekeerd naar Vietnam om de kweek ervan te bestuderen. Dit bewijst weer maar eens hoe belangrijk het kweken in beschermd milieu is.

Het houden vormt geen grote uitdaging. De soort is volwassen op 2/3 jaar tijd maar is niet aan



te raden voor beginnelingen. De omstandigheden waarin ze moeten gehouden worden is vergelijkbaar met die van de andere soorten die op deze breedtegraad wonen: in de winter moet zo een vorstvrij hok voorzien worden (bij voorkeur een verwarmde zitstok) en er moet rekening gehouden worden met de monogamie van de

soort en de vaak agressieve houding van het mannetje.



De Zilverfazanten (*Lophura nycthemera*)




Koppel Berlioz-zilverfazanten @ Aviornis West-Vlaanderen

De Laos-zilverfazant (*L.n.beaulieu*) Delacour & Jabouille 1928

De vertegenwoordigers van deze ondersoort lijken op de Jones-zilverfazant (de zwarte lijnen iets fijner, achterste deel van witte hals en staart wat korter) en een aantal onder hen, die langs de Mekong voorkomen, op de westelijke zilverfazant, wat de variabiliteit van deze ondersoort illustreert. Ze bezetten de vruchtbare alluviale valleien in het bassin van de Gele Rivier met een gematigd klimaat. Deze doorsnijden de bergketen in het noorden van Laos, waarvan de toppen tot meer dan 2000m hoog zijn en vormen de gemeenschappelijke grens met Vietnam. Men vindt deze ondersoort ook op de tegenover liggende noordelijke hellingen, te weten het zuid-oosten van Yunnan in China.

De Berlioz-zilverfazant (*L.n.berliozi*) Delacour & Jabouille 1928

Deze leeft in het centrum van Vietnam, op de hellingen oostelijk van het Annamgebergte op hoogtes tussen de 800m en 1500m in een bosachtig milieu dat eerder droog is en weinig dicht begroeid. Ze vormt een overgang tussen *beaulieu* in het noorden en *beli* in het zuiden van het verspreidingsgebied en is een buur van *jonesi* die een bredere zwarte tekening heeft.



haan Jones-zilver @Aviornis West-Vlaanderen



hen Jones-zilver @Aviornis West-Vlaanderen

De Bel-zilverfazant
(*L.n.beli*) Oustalet 1898

Deze fazant leeft op de hoogste toppen en kammen van de oostelijke hellingen van de Annam bergketen in centraal Annam van Faifoo tot in de buurt van Donghoi, boven de 1000m en tot 2000m. Ze werden ontdekt in 1896 en beschreven aan de hand van een koppel dat in 1897 levend aankwam in het Museum van Parijs en zich daar voortplantte. Ze werden er gehouden tot in 1907 en de laatste verdwenen er in 1910.

De Annam-zilverfazant (*L.n.annamensis*) Ogilvie-Grant 1906

Staat dicht bij de Boloven-zilverfazant (*L.n.engelbachi*) en houdt zich bij voorkeur op in de hogergelegen delen van de loof- en naaldbossen in de bergen van Zuid-Annam, meestal van 300 tot 1200 m.



Annam-Zilverfazant
@ ABV

Ghigi-chinquispauwfazant (*Polyplectron bicalcaratum ghigii*) Delacour & Jabouille 1924

De Chinquis-pauwfazant is de meest noordelijke van het geslacht. Deze fazanten verkiezen vochtige bergwouden tot 1500m hoogte, zelden hoger, maar het is niet uitzonderlijk dat men ze tot op zeeniveau aantreft.

Het verspreidingsgebied van de Ghigi-chinquis strekt zich uit van het centrum tot het noorden van Vietnam. Volgens J. Delacour, komt hij samen voor met de nominaat (*P.b.bicalcaratum*) langs de rode rivier, wat een reusachtig gebied behelst: Laos van het centrum tot het oosten, het noorden van Thailand en heel Birma.

Deze sterke fazanten worden volwassen in hun tweede jaar, maar nestelen in gevangenschap vaak al in het eerste jaar.



haan Chinquis pauwfazant @Keith Howman

Germain-pauwfazant (*polyplectron germani*) Elliot 1866

Alhoewel een buur van de *P. bicalcaratum*, wordt deze fazant als een afzonderlijke soort beschouwd,

voornamelijk omwille van de afwezigheid van een kuif en manen; de pauwfazanten van Maleisië en Sumatra daarentegen vertonen in hun vederkleed belangrijke verschillen met deze soort.

Habitat: vochtige, bijna ondoordringbare wouden met bomen, kreupelhout en stekelplanten van zeeniveau tot 1200m hoogte. Ondanks de ontoegankelijkheid van

hun leefomgeving wordt de Germain-pauwfazant steeds zeldzamer. Hij dankt zijn naam aan de importateur Germain die de eerste in 1875 naar Parijs bracht.



Germain-pauwfazant @ Paul Johnsgard

Daarentegen, als hij over een verwarmd verblijf beschikt, gedraagt hij zich goed in gevangenschap. De hen legt twee eieren en zorgt voor meerdere vervanglegsels als de eieren verwijderd worden. Daarom is het niet moeilijk een tiental jongen per jaar te bekomen.



koppel Germain-pauwfazanten met kuiken @ ABV

Bronvermelding:

- **Monographie des Faisans**, Alain Hennache & Michel Ottaviani.2005-2006.
- **Faisans et Paons**, Jean-Claude Perriquet.1996.
- **The Pheasants of the World**, Paul Johnsgard.1999.
- **Pheasants, their lives and homes**, William Beebe. 1926.
- **De hoenderfazanten**, Franz Duister. Aviornis International - (35e jaargang nr. 203)

Nieuwsflitsen

Een aantal van onze Focusgroepen draait op volle toeren, ook tijdens het zogenaamde dode seizoen.

Het **Tragopan DNA Project** blijft nog altijd even succesvol doorlopen.

De zevende fase is ondertussen volzet en 50 stalen zijn op het labo van BioGenomics aan de KU Leuven voor onderzoek. Aangezien de belangstelling voor de test blijft toenemen zijn we met ronde acht gestart en ook hiervoor zijn alweer heel wat inschrijvingen en stalen binnen. De kosten bedragen nog steeds 75 € per staal (70 € voor leden). Wie wil deelnemen, kan best per E-mail contact opnemen met Willy Tieleman: willy.tieleman@skynet.be met vermelding van soort en aantal van de te testen vogels. De nodige inlichtingen en omslagen voor staalname worden u dan toegezonden.

We willen er toch nog even op wijzen dat alleen geteste dieren (met een certificaat) of afstammelingen ervan (met TR-ring) aan het stamboek kunnen deelnemen.

Op vrijdag 30 januari had de groep een bijeenkomst waarop de nodige afspraken gemaakt werden en waar de concrete plannen voor de toekomst werden besproken.

In maart brengen enkele leden van de groep een werkbezoek aan de balgencollectie van het Natural History Museum te Tring in Engeland om grondig te onderzoeken of er ook bruikbare morfologische criteria gevonden kunnen worden.

De **focusgroep Kraagfazanten** vergaderde op vrijdag 23 januari om een stand van zaken op te maken en het komende kweekseizoen voor te bereiden. Er werden voldoende koppels goudfazanten in alle mogelijke combinaties binnen de werkgroep geplaatst en we kijken dus het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet.

De verwachtingen zijn vooral erg hoog gespannen voor wat de Lady Amherst-fazanten betreft. De grote vraag is of onze vogels van de zuivere bloedlijnen dit jaar al zullen leggen. Waarschijnlijk zijn ze nog te jong, maar je weet nooit. Ondertussen hebben we al nieuwe contacten voor het bekomen van eieren van dieren waarvan de herkomst tot in het wild kan worden nagegaan. Duimen dus!

Ook de focusgroep rond de **Vuurruggen** maakt plannen voor een museumbezoek, ditmaal aan het museum van Parijs. Vooral de ongekuifde vuurruggen moeten nog verder onderzocht worden omdat in de musea van Leiden en Tring onvoldoende materiaal aanwezig was.

Ondertussen gebeuren er weer uitwisselingen van vogels tussen de (jammer genoeg tamelijk) schaarse liefhebbers van deze interessante groep. Het feit dat deze dieren heel slecht tegen onze winters bestand zijn en dan dus bijna constant verwarming nodig hebben maakt deze prachtige vogels minder geliefd. Toch bestaan er gelukkig, mede dank zij het bestaan van de focusgroep, goede contacten tussen de liefhebbers in UK, Benelux en Duitsland.

Op onze komende jaarvergadering zullen alle groepen zoals steeds meer uitgebreid verslag uitbrengen van hun activiteiten.

Ons paradepaardje blijft het "**Saving the Edwards project**".

Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe WPA internationaal samenwerkt met EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AZA (de Amerikaanse tegenhanger ervan), WAZA (de wereld zoo-organisatie), IUCN, de Galliformes Specialist Group en Viet Nature.

De ECBG van WPA en de Galliformes TAG van EAZA spelen een sleutelrol in het *ex situ* gedeelte van het reddingsprogramma. Ons bestuurslid Ivan Roels en WPA-Duitsland bestuurslid Heiner Jacken coördineren de stamboeken van respectievelijk de Vietnam- en de Edwards-fazant voor alle private kwekers. Thomas Kapic van de Praagse Zoo runt het EEP-stamboek voor de Europese Dierentuinen, terwijl Chris Holmes van Houston Zoo (Texas)

hetzelfde doet voor de Amerikaanse vogels. Hij houdt tevens het ISB (internationaal stamboek) bij, waarin alle vogels zijn opgenomen.

Het verzamelen van de nodige stalen is inmiddels beëindigd en ze werden aan het labo bezorgd. Daar worden op dit ogenblik 20 Edwards' stalen, 20 Vietnam en 20 Swinhoe's onderzocht en onderling vergeleken. De onderhandelingen om ook uit Japan 12 stalen van de Edwards te bekomen zijn in een vergevorderd stadium. De administratieve rompslomp lijkt toch nog wat ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht, maar het is slechts een kwestie van tijd vooraleer we ook deze stalen kunnen laten onderzoeken. Op basis van alle resultaten zullen we dan in staat zijn alle eventueel kruisingen met de Swinhoe uit te bannen en binnen de zuivere dieren een keuze van zo onverwant mogelijke ouders te maken, teneinde de reddingspopulatie te starten.

In Vietnam zelf wordt ook verder gewerkt. De "Edwards's Pheasant Working Group" zal in Dong Hoi city, Quang Binh province, Vietnam, op 26 – 27 Maart 2015 een tweedaagse workshop houden. Het Quang Binh Forest Protection Department zal deze meeting organiseren, samen met Viet Nature. Het plan is te focussen op de finalisatie van het "Action Plan 2015-2019 for Edwards's Pheasant Conservation".

Op vraag van Viet Nature zorgden wij van hieruit voor de nodige updates betreffende onze activiteiten in Europa. Ook werden door WPA in samenspraak met de Galliformes TAG een aantal richtlijnen overgemaakt betreffende het opzetten van een kweekcentrum in Vietnam, met het oog op eventuele latere reïntroductie van de soort in daartoe geschikte natuureservaten.



Foto's bij Noël Hendriks

Lidmaatschap 2015

Het is ook weer hoog tijd om je lidmaatschap voor 2015 te vernieuwen door een storting of overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer:

voor het jaar 2015 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd:

Gewoon lidmaatschap : 27 Euro

Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro

Conservation-lid : 115 Euro

1093646 ING-bank Nederland

IBAN NL62INGB0001093646

BIC INGBNL2A

WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE

Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2015 vermelden?

Agenda

- 15 maart studiedag Wilde Duiven en Kleine Hoenderachtigen in Tielen, België
- 21 maart 2015 jaarvergadering WPA-Benelux in Overpelt
- 11-12 april WPA-Tjechië en Slovakije te Pilzen
- 30 april 1-2-3 mei 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA-Oostenrijk
- 4-5-6 sept WPA-UK 40 jarig bestaan WPA
- 11-12 sept WPA-Duitsland in Heidelberg
- 26 sept 2015 WPA-Benelux fazantendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen
- 9-10 oktober 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA Frankrijk. Locatie nog te bepalen.

Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het secretariaat.